

Patientvejledning. Hæmorider ved elastikmetoden.

Behandling af indvendige hæmorider ved elastikmetoden.

En indvendig hæmoride er en frembulning ind i den nederste del af endetarmen af en blodåre (vene) og den slimhinde, der ligger oven på blodåren.

Ved behandling med blodfortyndende medicin (f.eks. Magnyl, Plavix eller Marevan) eller midler mod depression SKAL dette oplyses i god tid inden operationen. Du skal om muligt holde pause med blodfortyndende medicin i 3 døgn før operationen. Kontakt egen læge ved tvivl.

Før operationen.

Du kan med fordel benytte et toilax-rektalvæske klyx et par timer før, du kommer i klinikken, for at sikre at der ikke er afføring i den nederste del af tarmen. Udleveres i klinikken ved henvendelse.

Behandlingen.

Da der ikke er smertesans på indersiden af tarmen, foretages behandlingen uden bedøvelse. Ved elastikmetoden sættes en lille og meget stram elastik hen over hæmoriden/frem-bulningen. Herved stoppes blodforsyningen til hæmoriden, som derefter ”visner” og falder af sammen med elastikken.

Efter behandlingen.

Mod smerter: Der kan det første halve til hele døgn føles stramning og afføringstrang. Hvis det generer, kan man tage et smertestillende håndkøbspræparat, Paracetamol, Kodimagnyl eller evt. Ibuprofen.

Restriktioner.

Der er ingen forholdsregler efter indgrebet, og man kan gå normalt på toilettet.

Det sker en sjælden gang, at man lige efter behandlingen føler en almen utilpashed. Dette skyldes en reaktion fra nerver tilhørende det ”selvstyrende nervesystem”. Denne tilstand kan føles meget ubehagelig, men den er helt ufarlig og vil hurtigt fortage sig efter at man har ligget et øjeblik, drukket et glas vand og/eller fået lidt frisk luft.

Man må i givet fald IKKE KØRE BIL, før man igen har det godt. Efter 8-10 dage vil den afsnørede hæmorroide falde af og forsvinde sammen med afføringen, evt. ledsaget af en smule blødning.

Komplikationer.

Yderst sjældent kan der fra 2-10 dage efter behandlingen opstå kraftig blødning fra tarmen.

Ligeledes kan der yderst sjældent optræde kraftige smerter i tarmen ledsaget af feber. Ved kraftig blødning, smerter eller feber bør klinikken tlf. 33113738, vagtlæge eller skadestue straks kontaktes.

Kirurgisk og Endoskopisk Klinik

v/Speciallæge Steffen Rosenstock

Rømersgade 19, 2. tv.

1362 København K.

Tidsbestilling man.-tors. kl. 9-15

Tlf. nr. 33113738

Afbud så tidligt som muligt, og senest dagen før. I tilfælde af udeblivelse kan der opkræves et gebyr!

Udfærdiget af SDO 10.september 2014. Revideret 1. juli 2020.