

Operationer i huden i lokalbedøvelse

Patientvejledning

Klinik for kirurgi og åreknudebehandling v. Torvehallerne

Speciallæge, dr.med. Steffen Rosenstock

Rømersgade 19, 2. tv.

1362 København K.

Tidsbestilling man.-tors. kl. 9.00-12.00 og

12.30 – 14.00

Tlf. nr. 3311 3738

www.rfkirurgi.dk

Før operationen

Du skal ikke faste. Du kan indtage din vanlige medicin som du plejer. Vi skal vide om du bruger blodfortyndende medicin, da dette øger risikoen for blødning efter operationen. Om muligt skal du holde pause med medicinen i 2 -5 døgn før undersøgelsen, afhængig af hvilken medicin du får. Kontakt klinikken hvis du er i tvivl. Undlad at smøre creme r på huden ved operationsområdet.

Operationen

Huden desinficeres. Operationsområdet optegnes med tusch. Lokalbedøvelsen sprøjtes ind under huden med en tynd nål, det svier og spænder i ca. 1 minut. Under operationen kan man mærke at kirurgen arbejder i området, men du bør ikke mærke smerter. De fleste operationer tager 15 - 20 minutter. Såret lukkes med tråde, der skal fjernes efter 7 - 12 dage her på klinikken eller hos din egen læge.

Efter operationen

Lokalbedøvelsen virker i 2 - 4 timer. Herefter kan du anvende Panodil eller Ipren/Ibuprofen, hvis du har smerter.

Forbinding

Forbindingen kan fjernes dagen efter operationen (efter 24 timer) , medmindre andet er aftalt. Ved behov kan såret derefter dækkes med Micropore -plaster

Restriktioner

Karbad, svømmehal og bad i havvand frarådes indtil trådene er fjernet. Svær fysisk træning , som involverer musklerne i det område du er opereret, kan medføre at arret bliver bredere og mere ujævnt. Vi anbefaler derfor at undgå træning af de lokale muskler i 14 dg.

Komplikationer

Der kan opstå en blodansamling i området, som forsvinder af sig selv efter 1 - 2 uger. Der kan komme sårbetændelse, som viser sig ved rødme, varme, ømhed, hævelse og evt. pussekretion fra såret. Nogle mennesker danner ekstra arvæv (keloid), som gør, at arret bliver klumpet og fortykket. I yderst sjældne tilfælde udvikles en overfølsomheds reaktion mod lokalbedøvelse ved operationen.

Ved større blødning, blodansamling eller tegn på betændelse (rødme, varme, hævelse, temperatur over 38,5) kontaktes klinikken tlf. 33113738, vagtlæge (1813) eller skadestue.

Heling

Alle operationsar vil være røde og hævede de først 2 -4 uger efter indgrebet. Man kan først regne med det endelige resultat, når det er gået 1 år efter operationen.

Afbud skal ske så tidligt som muligt, og senest hverdagen før. I tilfælde af udeblivelse kan der opkræves et gebyr på 500 kr