

Gastroskopi

**(kikkertundersøgelse af spiserør,
mavesæk og tolvfingertarm)**

Speciallægerne Rosenstock og Føgh
Rømersgade 19, 2. tv.
1362 København K.
Tidsbestilling man.-tors. kl. 9.00-12.00 og
12.30 -14.00
Tlf. nr. 3311 3738
www.rfkirurgi.dk



www.shutterstock.com · 1581658963

**Du har en tid til undersøgelse ved
speciallæge Steffen Rosenstock**

d. _____ kl. _____

Afbud skal ske så tidligt som muligt, og senest
hverdagen før. I tilfælde af udeblivelse opkræves et
gebyr på 500 kr

Du skal have lavet en gastroskopi.

Formålet med undersøgelsen er at undersøge om du har mavesår, spiserørsbetændelse, spiserørsbrok, forsnævringer, infektioner eller kræftforandringer

Forberedelse til undersøgelsen

Du må ikke spise de sidste 6 timer og du må ikke drikke de sidste 2 timer før undersøgelsen. Du kan indtage din vanlige medicin med en mundfuld vand. Hvis du får syrenedsættede medicin (Pantoprazol, Lanzoprazol, Omeprazol), bør du, hvis det er muligt, undlade at tage medicinen i 3 dage før undersøgelsen. Du kan i stedet tage håndkøbsmedicin mod for meget mavesyre (Balancid, Alminox, Galieve).

Selve undersøgelsen

Du skal ligge på venstre side, imens du undersøges. Undersøgelsen foregår vha. en bøjelig tynd kikkert. Kikkerten føres oftest ind igennem næsen. Hvis der ikke er plads i næsen, føres kikkerten ind igennem munden. Undersøgelsen går nemmere, hvis du undervejs forsøger at trække vejret dybt og regelmæssigt, ligger stille og undgår at snakke. Undersøgelsen varer 5-8 minutter, men kan vare længere, hvis der skal tages mange vævsprøver.

Lokalbedøvelse og beroligende medicin

De fleste mennesker synes at undersøgelsen er ubehagelig. Ved undersøgelse igennem næsen kan der være smerter i næsen, når kikkerten passerer næsehulrummet og der kan også opstå en smule næseblødning efter undersøgelsen. Hvis undersøgelsen foregår igennem svælget, skyldes

ubehaget svælgreflekser, som kan være svære at kontrollere. Du bliver enten lokalbedøvet i næsen med en flydende gel eller i sprayet i svælget med en lokalbedøvende spray før kikkerten nedføres i mavesækken. Sig til hvis du ikke kan tåle lokalbedøvelse. Bedøvelsen smager grimt, og virker i 15-30 minutter. De fleste mennesker kan tolerere undersøgelsen uden væsentligt ubehag. Nogle har brug for beroligende medicin, fordi de har svært ved at samarbejde til undersøgelsen. Husk at sige til hvis du ønsker beroligende medicin. **Hvis du får beroligende medicin, må du ikke køre bil resten af dagen.**

Efter undersøgelsen.

Du får information om resultatet af undersøgelsen med det samme. Hvis der er givet lokalbedøvelse med spray, må du først spise og drikke efter 30-45 minutter. Hvis der er taget vævsprøver, vil der normalt foreligge svar efter 7-10 dage. Svar på test for *Helicobacter pylori* infektion foreligger samme dag.

Komplikationer.

Det er normalt at være lidt øm i hals eller næse efter undersøgelsen. Komplikationer ses stort set aldrig ved denne undersøgelse. Hvis der er taget biopsier eller fjernet væv, kan der opstå blødning eller perforation (hul). Det vil medføre udtalte mavesmerter og utilpashed.

Får du tegn på dette, skal du straks kontakte klinikken på tlf. 33113738, lægevagten på tlf. 1813 eller tage til nærmeste skadestue.

